

TRAVAUX DU MOIS

DATES	NATURE DES TRAVAUX	ÉPOQUE DE LA RÉCOLTE
18	Montez	
25	Semez sur la 1 ^{re} couche.	
	<p><i>La 1^{re} couche</i> à utiliser de suite ou seulement le 25 couche chaude de 5 châssis, épaisse de 30 centimètres et entourée de réchauds).</p> <p><i>Carotte rouge à forcer paris. ou bien C. Davanture;</i> pet. <i>carotte</i>, dans 2 châssis seulement (n^{os} 1 et 2).</p> <p><i>Radis demi-long rose à bout blanc</i> (très clair), dans les 2 châssis où vous venez de répandre la graine de carotte n^{os} 1 et 2.</p> <p><i>Céleri plein blanc doré</i> en pépinière, une ligne seulement dans le châssis n^o 3; vous le repiquez sur la même couche en fin février et en planterez sous châssis en mars ou en planche en mai.</p> <p><i>Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt</i> ou si vous préférez ch. fleur nain extra hât. <i>Boule de neige</i>; en pépinière, une ligne seulement (châssis n^o 3). Vous le planterez sur la 2^e couche le 20 mars.</p> <p><i>Concombre blanc hâtif</i>, en pépinière, quelques graines seulement, dans le châssis n^o 3. Vous aurez à repiquer 6 semaines plus tard sur une petite couche chaude; pour planter dans le coffre A de la 3^e couche en avril, vous pourriez préférer à cette méthode l'achat de 2 pieds de concombres cultivés en godets chez un spécialiste; plantez-les le 20 mars.</p> <p><i>Navel demi-long blanc à forcer</i> (châssis n^o 3), deux ou trois lignes; vous éclaircirez 3 semaines plus tard.</p> <p><i>Poireau gros court de Rouen</i> (châssis n^o 3), une ligne en pépinière; mettez en place le 25 avril.</p> <p><i>Chou milan de Plainpalais</i> (châssis n^o 3), une demi-ligne; vous les repiquerez en pleine terre ou sous cloche le 15 mars et les planterez en coteau ou en planche le 20 avril.</p> <p><i>Laitue gotte</i>, 12 à 16 pieds dans chacun des châssis 1 et 2 et la moitié du châssis n^o 4.</p> <p><i>Laitue à forcer de Milly</i>, un demi-châssis n^o 4.</p> <p><i>Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt</i> (semé le 15 octobre sous cloche). 4 pieds dans les châssis 1 et 2.</p> <p><i>Barbe de capucin</i> ou <i>Pissenlit</i> dans le coffre C, sous le châssis n^o 5 (racines enjaguées en plein air ou en cave en novembre); recouvrez d'un paillason pour obtenir des feuilles parfaitement blanches.</p> <p><i>Estragon</i> et <i>Ciboulette</i>, deux ou trois pieds dans un angle du châssis n^o 3 pour obtenir quelques pousses.</p>	<p>Avril.</p> <p>Février.</p> <p>Avant-déc</p> <p>juin à juillet.</p> <p>Mai-juill.</p> <p>25 mars-avril.</p> <p>1^{er} juin.</p> <p>Juin.</p> <p>20 février-10 mars.</p> <p>10-20 mars</p> <p>10 avril.</p> <p>Février-mars.</p> <p>Février-mars.</p>

DATES	NATURE DES TRAVAUX	ÉPOQUE DE LA RÉCOLTE	
25	<p>Abritez dans le coffre B.</p> <p>Abritez dans le coffre B.</p> <p>Enfoncez.</p> <p>Visitez.</p> <p>Confectionnez.</p>	<p>8 Artichauts en godets, Cerfeuil, Ciboulette, Oseille et Persil.</p> <p>Les dernières Chicorées et Scaroles au moyen de châssis en papier ou de paillasons.</p> <p>Ail, Échalote, Oignons déracinés par les gelées.</p> <p>Racines et bulbes réservés comme porte-graines.</p> <p>Paillasons, tuteurs, rames, claies.</p>	<p>Hiver.</p> <p>Hiver.</p>

PRODUITS DU JARDIN

bons à récolter ou à consommer.

<p><i>Ail blanc</i>, planté le 20 novembre (ou le 5 mars) et récolté fin juillet.</p> <p><i>Betterave rouge crapaudine</i>, semée le 15 avril et rentrée en octobre.</p> <p><i>Carotte nantaise</i>, semée le 1^{er} mai et récoltée en novembre.</p> <p><i>Céleri-rave</i>, semé le 1^{er} mai et récolté en novembre.</p> <p><i>Cerfeuil</i>, semé le 5 septembre et abrité sous un châssis ou sous une cloche.</p> <p><i>Chicorée frisée</i> et <i>Scarole en cornet</i>, semées le 10 juillet et rentrées en jauge en cave ou sous le châssis n^o 5.</p> <p><i>Chou Milan de Pontoise</i> (et <i>Ch. M. de Norvège</i>), semé le 25 mai et planté le 15 juillet.</p> <p><i>Chou Milan gros des Vertus</i>, <i>Ch. Quintal</i>, <i>Ch. rouge gros</i>, semés le 25 avril et plantés le 10 juin.</p> <p><i>Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle</i>, semé le 25 avril, planté le 15 juin (2^e saison).</p> <p><i>Chou-rave violet hâtif de Vienne</i>, semé le 1^{er} juin et planté le 10 juillet.</p> <p><i>Cresson de fontaine</i>, planté à froid sous châssis, le 25 octobre.</p> <p><i>Crosne du Japon</i>, planté le 1^{er} avril.</p> <p><i>Échalote</i>, récoltée en juillet.</p> <p><i>Épinard de Viroslav</i>, semé le 20 août et abrité par des châssis.</p> <p><i>Haricot en grains</i> (secs) et <i>Haricot vert</i> de conserve (semis du printemps).</p>	<p><i>Igname de Chine</i>, plantée au printemps ou au print. de l'an. précéd.</p> <p><i>Laitue gotte à gr. bl.</i>, semée le 1^{er} octobre.</p> <p><i>Mâche à cœur plein</i>, semée le 20 août.</p> <p><i>Navel de Meaux</i>, semé le 1^{er} août et récolté en novembre.</p> <p><i>Oignon jaune paille des Vertus</i>, récolté en juillet et août.</p> <p><i>Oseille de Belleville</i>, sous châssis à froid ou sous cloche; semée le 10 août pour la consommation hivernale.</p> <p><i>Panais rond hâtif</i>, semé le 15 avril et récolté fin octobre.</p> <p><i>Pastèque à gr. r.</i> (en confiture).</p> <p><i>Persil commun</i>, semé en août et abrité pour l'hiver.</p> <p><i>Pissenlit amélioré</i>, semé le 1^{er} juin et arraché pour être mis en jauge en novembre et décembre.</p> <p><i>Poireau monstrueux de Carentan</i>, semé le 15 mai.</p> <p><i>Pomme de terre Saucisse</i> et <i>Early</i>, plantée le 20 avril.</p> <p><i>Potiron rouge vis d'Etampes</i> et <i>Turban du Natal</i>, récoltés en novembre.</p> <p><i>Scorsonère</i>, semé le 25 avril et conservé en terre.</p> <p><i>Thym</i>, planté en avril ou l'année précédente.</p> <p><i>Tomate</i>, en conserve.</p>
---	--